

তুঁত পাতার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা ও তার প্রতিকার

নাম: মিলিবাগ (ম্যাকোনেলিক্লাস হিরসুটাস)

আক্রমণের সময় : মার্চ থেকে আগস্ট

অর্থনৈতিক ক্ষতির স্তর: ডানপ্রতি ১০ টি

ক্ষতির পরিমাণ: ২০-৪০%

লক্ষণ

- গাছের অগ্রভাগ স্ফীত সবুজ ঝাড়ের মত হয়
- পাতা কুঁকড়ে যায় এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়
- পাতা ঘন সবুজ দেখা যায়
- পরে পীত বর্ণ ধারণ করে এবং ঝরে যায়



প্রতিকারের উপায়

- গাছের আক্রান্ত অংশ গুলি কেটে নষ্ট করতে হবে
- ০.১%ডায়মেথয়েট (রোগর) (৩০ই. সি.) ৩ মি.লি. প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- ১৫দিন পর পাতা খাওয়ানো যাবে
- জৈবিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে প্রতি একরে ১০০০ বন্ধুপোকা (স্কীমনাস পেগ্লিডিকলি) জমিতে ছাড়তে হবে

নাম : থ্রিপ্স (সুডোডেনড্রথ্রিপ্স মোরি)

আক্রমণের সময়: মার্চ থেকে জুন

অর্থনৈতিক ক্ষতির স্তর: : পাতা প্রতি ২০ টি

ক্ষতির পরিমাণ : ২০-৪০%

লক্ষণ

- পাতায় চাঁচা ও খসখসে দাগ দেখা যায়
- পাতা নৌকার আকার ধারণ করে
- পাতার ধার বাদামী রঙের হয়ে উপরের দিকে কুঁচকে যায়
- ধীরে ধীরে পাতা মচমচে ,ভঙ্গুর হয়ে ঝরে যায়



প্রতিকারের উপায়

তুঁত জমিতে ছিটিয়ে জল দিয়ে থ্রিপ্সের লার্ভা গুলি মেরে ফেলতে হবে

- ০.১%ডায়মেথয়েট (রোগর) (৩০ই. সি.) ৩ মি.লি. প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- ১৫দিন পর পাতা খাওয়ানো যাবে
- জৈবিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে প্রতি একরে ১০০০বন্ধুপোকা - ক্রাইসোপারলার ডিম জমিতে ছাড়তে হবে

নাম:সাদামাছি(ডায়ালিউরোপরা ডিসেমপাংটা)

আক্রমণের সময় : জুন থেকে ডিসেম্বর

অর্থনৈতিক ক্ষতির স্তর: : পাতা প্রতি ২০ টি

ক্ষতির পরিমাণ : ২৫ %

লক্ষণ

- পাতায় ক্লোরোসিস ওকুঁচকে যাওয়া লক্ষণ দেখা যায়
- পাতার নিচের দিকে নীলচে ছাপ দেখা যায়
- পাতায় সুটিমোল্ড ছত্রাক বৃদ্ধির ফলে পাতা কালো হয়ে যায়



প্রতিকারের উপায়

- জুন থেকে নভেম্বর এর মধ্যে জমিতে একর প্রতি ৬০ টি হলুদ আঁটালো ফাঁদ স্থাপন করতে হবে
- ০.০১৫% থায়ামেথক্সম(২৫ডাক্স. জি.) ৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- ১৫দিন পর পাতা খাওয়ানো যাবে
- জৈবিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে প্রতি একরে ৫০০ জোড়া - ব্রুমইডিস সুটুরালিস নামক বন্ধুপোকা জমিতে ছাড়তে হবে

নাম : বিহারী শূঁয়াপোকা

আক্রমণের সময় : আগস্ট থেকে নভেম্বর

ক্ষতির পরিমাণ : ২৫ %

লক্ষণ

- পাতার শিরাগুলি উন্মুক্ত হয়ে একটি জালের আকার ধারণ করে
- আক্রান্ত পাতাগুলি শুকিয়ে যায় এবং সহজেই ঝরে যায়



প্রতিকারের উপায়

- পাতায় আক্রান্ত প্রাথমিক অবস্থার দশাগুলি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- বিহারী শূঁয়াপোকা ও আক্রান্ত পাতাগুলি সংগ্রহ করে সাবান জলে ডুবিয়ে নষ্ট করতে হবে
- তুঁত জমিতে ২০০ ওয়াট যুক্ত মার্কারি ভেপার বাতি জলের পাত্রের সাথে বসালে শূঁয়াপোকার মথ ধরা যাবে

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে তুঁত পাতার ক্ষতিকারক পোকার নিয়ন্ত্রণ

লেডিবার্ড বিটল(বন্ধুপোকা) (স্কীমনাস পেল্লিডিকলি) মিলিবাগ (টুকরা) এর জন্য

- এরা অত্যন্ত ক্ষুধার্তের মতন মিলিবাগের সমস্ত দশাগুলিকে খেয়ে ফেলে এরা মিলিবাগের ডিমের কলোনির মধ্যে নিজেরা ডিম পারে
- পূর্ণাঙ্গ শিকারী বন্ধু পোকাগুলি মিলিবাগের নিষ্ফ থেকে শুরু করে সমস্ত দশা গুলিকে ২০ দিন ধরে খেতে থাকে
- বছরে ৬ মাস অন্তর প্রতি একরে ১০০০ বন্ধু পোকা দুইবার ছাড়তে হবে



মিলিবাগ



স্কীমনাস বিটল



গ্রীন লেসউইং (ক্রাইসোপারলা) থ্রিপ্স এর জন্য

- এরা থ্রিপ্সের ডিম থেকে শুরু করে সমস্ত দশা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ৭ দিন পর পিউপায় পরিণত হয়
- ক্রাইসোপারলার পূর্ণাঙ্গ দশা রেড়ী ফুলের রেণু এবং শর্করা জাতীয় খাবার খেয়ে পাতার উপর ডিম দেয়
- ডিম থেকে বেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ বন্ধুপোকা আট-দশ দিন ধরে থ্রিপ্সের বিভিন্ন দশা খেয়ে ধ্বংস করে
- বছরে প্রতি একরে ১০০০ ক্রাইসোপারলার ডিম এক সপ্তাহ অন্তর দুইবার ছাড়তে হবে



থ্রিপ্স



ক্রাইসোপারলা লার্ভা



ক্রাইসোপারলা ডিম

বন্ধুপোকা পাওয়া যাবে

সিএস আর টি আই, বহরমপুর অথবা সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড এর স্থানীয় অফিসে